

Anleitung zur Kultivierung seltener Pflanzenarten

Art **Blackstonia acuminata, Spätblühender Bitterling**

Verbreitung Im Kanton Zürich keine Fundstellen mehr, in der Schweiz sehr selten.

Standort Auf sandigen wechselfeuchten bis wechsellrockenen Böden.

Besonderes Attraktive Blütenstände mit intensiv gelben Blüten.

Vermehrung über Samen

Kultur

- *Aussaat* Im Herbst (Kaltkeimer). Ausbildung des Blütenstands bereits im ersten Jahr (im Gegensatz zu *Blackstonia perfoliata*).
- *Platzbedarf* Minimum: ca. 0.05 m², optimal: ca. 0.1 bis 0.5 m².
- *Kultivierung* Einfach bis mittel schwierig (?), genügend Licht und keine Konkurrenz, vor Schneckenfrass schützen.
- *Ernte* Samen ernten da Pflanze nur einjährig ist, d.h. nach dem Fruchten abstirbt. Reife Fruchtstände ernten, nicht drehen sonst fallen Samen bereits heraus, in Papiertüten geben, mehrmals schütteln, Samen mit feinem Sieb absieben und in kleinen dichten Papiertüten, trocken und kalt aufbewahren.
- *Produktion* Samen ernten, da einjährig keine Pflanzenproduktion

Verwendung für Naturschutz Kontrollierte Ansiedlungen, ausschliesslich in Rücksprache und Übereinkunft mit Fachstelle Naturschutz Populationsneubegründung in speziellen neugestalteten Biotopen.



Blackstonia acuminata
aus Hess, Landolt
und Hirzel