

Kultur von *Orchis palustris*

Stand 27.03.2012/ChS

1 Vegetationsstadien und durchzuführende Arbeiten

Zeipunkt	Phase	Aktionen
(Juni) Juli-August	Blätter eingezogen	Knollen können ein- und umgetopft werden.
(Juli) August - September	Pflanzen eingezogen: Überwinterung	<p>Töpfe leicht beschatten und nicht austrocknen lassen: Töpfe im flachem (1cm) Wasser stehen lassen.</p> <p>Begleitpflanzen mit scharfer Schere zurückschneiden.</p> <p><u>In der GAW:</u></p> <p>Töpfe stehen im obersten Beet und sind von den oberhalb stehenden Bäumen vormittags immer beschattet.</p>
September – März	Pflanzen eingezogen: Überwinterung	Sobald Temperaturen unter 0°C Töpfe mit Vlies zudecken.
März, April (Mai)	Blätter beginnen zu treiben	<p>Vlies entfernen.</p> <p>Schützen vor Mäusen und Schnecken -> Schneckenkörner!</p> <p>ChS: Blätter protokollieren.</p>
April-Juni	Blätter sind sichtbar und wachsen	<p>Töpfe sollten immer leicht im Wasser stehen, Blätter dürfen jedoch nie überschwemmt werden. Solange es genügend feucht ist, erträgt <i>O. palustris</i> auch Wärme gut, darf aber nie austrocknen.</p> <p>ChS: Blätter protokollieren.</p>
Juni	Blüte	<p>Sobald sich Blütenstand zu bilden beginnt, ChS informieren.</p> <p>ChS: Bestäuben, protokollieren.</p>
(Juni) Juli, (August)	Frucht	<p>Sobald Früchte leicht braun werden, ChS informieren.</p> <p>ChS: Samen ernten, protokollieren.</p>

August – September	Blätter eingezogen: Übersommernung	Töpfe leicht beschatten (siehe oben).
-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------

2 Besonderes zu beachten

Wasser	Kalkhaltiges Wasser verwenden
Düngung	Vorläufig keine!
Jäten	Jäten generell nur solange Orchideen in Ruhephase sind, denn während der Wachstumsphase könnten die empfindlichen Wurzeln beim Jäten verletzt werden. Falls während der Wachstumsphase Begleitpflanzen entfernt werden müssen, diese mit scharfer Schere zurückschneiden.